

予防接種スケジュール

定期接種の推奨期間

任意接種の推奨期間

定期接種の接種可能な期間

任意接種の摂取可能な期間

ワクチン名	種類	乳児期							幼児期					学童期						青年期						
		6週	2ヶ月	3ヶ月	4ヶ月	5ヶ月	6~8ヶ月	9~11ヶ月	12~15ヶ月	16~17ヶ月	18~23ヶ月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳
四種混合 (DPT-IPV)	三種混合 (DPT)			①	②		③		④	注1																
	ポリオ (IPV)																									
BCG	生					①																				
麻疹、風疹 (MR)	生								①					②												
日本脳炎	不活化										①	②	③					④								
二種混合 (DT)	不活化																				①					
インフルエンザ菌 b 型 (ヒブ)	不活化		①	②	③				④	注2																
肺炎球菌結合型 (PCV7)	不活化		①	②	③				④	注3																
ヒトパピローマウイルス	2価																				①	②	③	注4		
	4価																									
B型肝炎	不活化		①	②			③	注5																		
ロタウイルス	1価		①	②																						
	5価		①	②	③																					
水痘 (水ぼうそう)	生								①		②															
おたふくかぜ	生								①					②												
インフルエンザ	不活化																	①	②							①

注1：③-④の間は6ヶ月以上あけ、標準的には③後12-18ヶ月の間に接種

注2：③-④は7-13ヶ月あける

注3：③-④は60日以上あける

注4：2価は0, 1, 6ヶ月後、4価は0, 2, 6ヶ月後に接種

注5：①-②は4週間隔、③は①から20-24週経過後